


آندوسکوپی دستگاه گوارش روشی است که به پزشک اجازه می دهد قسمت داخل مری ، معده و دوازدهه ( قسمت اول روده باریک ) را به طور مستقیم مورد معاینه قرار دهد .



تهیه تصاویر برای ثبت اطلاعات و تهیه نمونه های بافتی و ترشحات نیز با این روش قابل انجام است . این روش مدودا 30 دقیقه طول می کشد.

در آندوسکوپی لوله ای نسبتاً نازک ، بلند و قابل انعطاف را که به یک منبع نوری متصل است پس از بی مس نمودن ملق با اسپری بی مسی از راه دهان وارد دستگاه گوارش می کنند و از این طریق امکان بررسی قسمت های مختلف دستگاه گوارش فوقانی به وجود می آید .

### موارد انجام آندوسکوپی


آندوسکوپی بهترین روش برای بررسی علت فونریزی دستگاه گوارش فوقانی است . سایر موارد انجام آندوسکوپی عبارتند از :

- بررسی و تشخیص علت مشکلاتی مثل درد مداوم قسمت فوقانی شکم ، تهوع ، استفراغ ، اشکال در بلع و یا سوزش سر دل
- فارغ کردن جسم خارجی از دستگاه گوارش
- تشخیص ناهنجاری های مری ، معده یا دوازدهه و نیز تومورها و سرطان هایی که در مراحل اولیه هستند .
- انجام نمونه برداری و تشخیص تومورهای بد فییم از تومورهای فوش فییم
- تشخیص عفونت هلیکوباکترپیلوری

### مین آندوسکوپی چه اتفاقی می افتد ؟

جهت انجام آندوسکوپی شما به صورت خوابیده روی پهلوئی چپ قرار داده می شوید. پزشک، سر آندوسکوپ را روی زبان شما قرار

داده و آن را به سمت گلو می برد و از شما می فواهد که آن را قورت دهید، با این کار، مری باز شده و آندوسکوپ داخل آن می شود و سپس به سمت پایین و معده می رود . وقتی که سر آندوسکوپ وارد معده شد، از طریق یک لوله که در آندوسکوپ قرار دارد، معده باد می شود تا مشاهده داخل آن بهتر انجام شود. در صورت مشاهده موارد مشکوک، پزشک ممکن است اقدام به نمونه برداری (تکه برداری یا بیوپسی) نماید که این کار، کاملاً بدون درد می باشد . وقتی که کار پزشک تمام شد ، آندوسکوپ به بیرون کشیده می شود .




### اشکالاتی که ممکن است در طی انجام آندوسکوپی، برای شما ایجاد شوند عبارتند از:

- احساس فشار در گلو و گاهی اوقات احساس ناراحتی در شکم و آروغ زدن ( به خاطر هوایی که به داخل معده فرستاده می شود ).



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران  
مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی فیروزگر  
بمفقت آموزشی بیمار  
کد : 7 - N15

## در مورد آندوسکوپی دستگاه گوارش چه می دانید؟



از انجام آندوسکوپی ( تا برگشتن رفلکس بلع ) از خوردن یا آشامیدن پرهیز کنید .

• بهتر است غذا خوردن را با غذاهای نرم و ملایم شروع کنید و تا زمانی که درد گلو بهبود یابد ، آن را ادامه دهید .

• از آنجا که در مین آندوسکوپی آرامبخش به شما تزریق می شود ، لازم است محدود 2 ساعت بعد از آندوسکوپی استراحت کنید و تا 12 ساعت از رانندگی خودداری نمایید .

• ناراحتی جزئی در گلو ، با غرغره کردن با سرم نمکی گرم و یا مسکن های فوراکی قابل رفع می باشد .

• در زمان مقرر جهت دریافت نتیجه پاتولوژی مراجعه کنید و آن را به رویت پزشکتان برسانید تا ادامه درمان انجام گیرد .

• در صورتی که در طی 72 - 24 ساعت دچار درد شدید شکمی ، تب ، لرز و یا فونریزی ( استفراغ فونی یا مدفوع تیره رنگ ) ، اشکال در بلع و بلع دردناک و یا مشکلات تنفسی شدید ، باید سریعاً به مرکز درمانی مراجعه نمایید .

آدرس: تهران، میدان ولیعصر ، فیابان کریم خان زند ، فیابان به آفرین .

مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی فیروزگر H\_Firoozgar@yahoo.com

تلفن: 88937902-5 ، 88942661-4 ، 82141201

وب سایت آموزش به مددجو - معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

<http://helplums.ac.ir>

بهداشتی درمانی ایران

• در هنگام داخل کردن نوک آندوسکوپ به سمت گلو ممکن است شما یکی دوبار آروغ بزنید که این یک واکنش طبیعی می باشد .

### آمادگی های قبل از آندوسکوپی



• قبل از انجام آندوسکوپی ، معده باید فالی باشد . 8 ساعت قبل از آندوسکوپی نباید چیزی بخورید یا بیاشامید .

• مصرف هر گونه دارو ( به عنوان مثال : ضد انعقادها ) را به پزشک اطلاع دهید .

• اگر بیماری فاصی مثل بیماری های قلبی ، ریوی و ... دارید متماً پزشک فودرامطلع کنید ، چون ممکن است ملامضات فاصی لازم باشد .

• در صورت داشتن دندان مصنوعی و یا لنز پشمی، آنها را خارج کنید .

### مراقبت های بعد از آندوسکوپی

• به دلیل بی مسی موضعی در قسمت ملق و فطر آسپیراسیون مواد به داخل ریه ، حداقل تا 2-1 ساعت بعد